

### EFTER OPERATIONEN:

Barnet vil være lidt træt og måske forkvalmet resten af dagen efter operationen. Det må spise og drikke som det plejer, og skal være under voksent opsyn det første døgn. Giv gerne lidt smertestillende efter indgrebet da der kan være lette smerter den første dag. Man kan roligt sende barnet i skole/ børneinstitution dagen efter. Hørelsen vil stort set være normaliseret straks efter operationen, og barnet vil derfor hurtigt igen kunne indgå i det sociale samvær som vanligt.

### FORHOLDSREGLER NÅR BARNET HAR DRÆN:

Generelt er der ikke særlige risici forbundet med at have dræn i ørene. Når man ser bort fra urent vand i ørerne, har barnet formindsket risiko for at få mellemørebetændelse, og bør som sådan heller ikke opføre sig anderledes end andre børn uden dræn.




### Pas på urene swimmingpools

Hvis barnet svømmer i urent vand (som for eksempel ofte ses i swimmingpools på mange turistdestinationer), kan der spredes bakterier via øregangen og drænet. Dette kan forårsage mellemørebetændelse. Der vil derfor være øget risiko for, at der efterfølgende kommer øreflåd, hvis barnet bader og svømmer i urent vand og samtidig har dræn. Barnet må derfor heller ikke dykke så længe det har dræn.

### Undgå sæbevand i ørene

Sæbe nedsætter overfladespændingen i vand. Det medfører, at sæbevandet let passerer gennem drænet, og ofte trænger ind og forårsager irritation af mellemøreslimhinden. Hvis man ikke kan undgå at skylle sæbevand ind i ørerne, kan lidt vandskyende vat eller ørepropper anvendes. Det gælder for eksempel ved badning i badekar og ved hårvask.

## PATIENTINFORMATION - ANLÆGGELSE AF DRÆN




## BØRN & DRÆN

Alle børn oplever at blive forkølede, og nogle børn rammes mere end andre. Forkølelser opstår hele året, og er mere udbredte om efteråret og vinter, hvor vi er mere indenfor og lettere kan viderebringe smitte.

Når et barn bliver forkølet dannes der snot som løber ud af næsen, ned i halsen og ud i ørerne hvor det trykker på trommehinden. Nogle børn er mere disponerede for at netop deres forkølelse giver gener i ørerne i form af væske, og måske bliver til en mellemørebetændelse. Disse børn kan opleve at væsken i mellemøret, kan påvirke deres adfærd og hørelse i en sådan grad at det går udover både almen trivsel samt tale- og sprogudvikling. I disse tilfælde kan det komme på tale at anbefale behandling med dræn.

Drænet er et meget lille rør, som anbringes i trommehinden for at forbinde hulrummet i mellemøret med den eksterne øregang. Dette lader luft passere ind i mellemøret til ventilation og/eller drænage af væske fra mellemøret til den eksterne øregang.



Barnet vil således stadig kunne blive forkølet og måske få mellemørebetændelse selvom det har fået anlagt dræn, på samme vis som børn uden dræn kan få det, men drænet vil hjælpe barnet med at komme af med den væske der samler sig i øret og dermed også virke smertelindrende så barnets søvn og trivsel ikke påvirkes negativt.

De fleste børn vokser fra problemerne i 2-3 årsalderen, men nogle børn har problemer helt op i teenagealderen. Det afhænger bl.a. af, hvornår barnet udvikler en tilfredsstillende funktion af øretrompeten, samt hvornår barnets immunsystem bliver i stand til at modstå den smitte, det er udsat for i hverdagen.

## OPERATIONSTID TIL ANLÆGGELSE AF DRÆN:

Onsdag d. \_\_\_\_\_ kl. \_\_\_\_\_

### VIGTIG LÆSNING - FØR OPERATIONEN:

**Barnet skal være fastende 6 timer før med mad/mælk samt 2 timer før med vand /sød saft da operationen foregår i fuld bedøvelse! Overholdes dette ikke, vil Narkoselægen afvise at bedøve barnet.**

Mød op i god tid af hensyn til roen omkring barnet og det øvrige operationsprogram. Sørg for at barnet har fået tisset af. Giv gerne en stikpille med smertestillende medicin (fx paracetamol) efter barnets vægt 2 timer inden operationen.

Barnet bliver kaldt ind på stuen af Klinikchefen hvorefter Narkoselægen vil indhente relevante oplysninger herunder barnets vægt. Narkoselægen påbegynder derefter bedøvelsen der foregår ved, at barnet indånder narkosegasser gennem en maske. I får lov til at blive hos barnet indtil det sover. Under operationen tager I plads i venteværelset.

Når operationen er overstået flyttes barnet til opvågningen og I bliver hentet ind så I kan sidde ved barnet mens det vågner. Barnet vil være lidt omtumlet, ofte grædende og uroligt. Der er en Narkosesygeplejerske på stuen sammen med jer. Når Øre-næse-halslægen har tilsat barnet og givet grønt lys, kan I tage hjem. I skal gerne være to voksne hvis I kører i bil.

Efter operationen kan der ved akutte spørgsmål ringes på operationstelefonen på tlf.nr 69150331 indtil kl. 18. Herefter er det vagtlæge der skal tages kontakt til.

Begynder det at flyde fra ørerne indenfor de første 7 dage efter operationen skal klinikken kontaktes på tlf.nr. 75122125.

